

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Основные факты

- Определение
 - Злокачественные опухоли, проявившие себя клинически в интервале между скрининговыми маммографиями
 - Предшествующий скрининг и клиническое обследование (по результатам первого скрининга) не выявили РМЖ
 - В эту категорию не входят случаи РМЖ, установленные при вызове на клиническое обследование по результатам первого скринингового обследования
 - Пропущенный РМЖ: нераспознанный во время скрининга, выявленный при повторном рассмотрении старых маммограмм
 - Истинный интервальный РМЖ: не наблюдался и не предполагался при скрининге
- Классический вид
 - Мог быть заподозрен, но был пропущен при первичном анализе маммограмм («пропущенный РМЖ»)
 - Маленькое, плохо определяемое, асимметричное уплотнение или объемное образование
 - Едва различимые микрокальцинаты
 - Едва различимая деформация структуры ткани железы
 - Не было никаких признаков РМЖ («истинный интервальный РМЖ»)
- Другие важные факты
 - Часто встречается:
 - У женщин моложе 50 лет
 - У женщин с очень плотными молочными железами (относительные шансы — OR 6,1)¹
 - У женщин со случаями повторного вызова после скрининговой маммографии и заключением о доброкачественном процессе (относительные шансы — OR 3,2)
 - При неправильной укладке молочной железы во время маммографии (относительные шансы — OR 2,6)
 - В целом случаи интервального рака более агрессивны, чем случаи, выявленные при скрининговой маммографии

¹ OR = odds ratio или относительные шансы оценивают отношение вероятности чего-либо (шанса) в одной выборке по отношению к вероятности того же самого в другой выборке (прим. ред.)